


La pharmacovigilance





Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
AREDIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
OSTEPAM BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
PORPHYRIE	Anesthésiques		
PROBLÈMES CARDIAQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		

Cette fenêtre permet de modifier le fichier qui contient l'essentiel des pathologies et médicaments pré enregistrés afin de piloter l'ensemble des mécanismes de pharmacovigilance

Ajouter

Supprimer

La pharmacovigilance

S'exerce à deux niveaux :

- ⇒ Lors de l'ouverture du dossier des patients, en affichant s'il y a lieu, un ou plusieurs messages d'alerte
- ⇒ Lors de la rédaction des ordonnances, en vérifiant si l'un des antécédents du patient ou l'un des médicaments pris régulièrement par celui-ci, contre-indique une prescription
- ⇒ S'il s'agit d'un enfant, le programme vérifiera aussi si la prescription n'est pas réservée aux adultes

Exemple

Fichier de Pharmacovigilance

Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
AREDIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
PORPHYRIE	Anesthésiques	EXTRACTION	
PROBLÈMES GASTROLOGIQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		

Ajouter Supprimer

Contre-indications Avertissements Anesthésies

Porphyries
Contre indications : anesthésies

Patient avec antécédents "porphyrie hépatique"

Données bio Antécédents ⚠ Prescriptions chroniques Allergies 🎯 🧪

+	💣	GLANDES SURRENALES NE FONCTIONNANT PLUS		▲	▲
📖	📖	Porphyrie hépatique			
📖	📖	Hypertension			
📖	📖	Polyarthrite rhumatoïde			
	💣	ABLATION DE LA VESTICULE		▼	
	💣	CRISTALX CALCAÏQUES - MUSCLES CERVICAUX			

L'état du patient n'a pas été revu

À l'ouverture de la
fiche patient
Alerte

🚩

Antithrombotiques
Antithrombotiques enregistrés pour ce patient :
KARDEGIC 75MG SACHET 30
Cela peut représenter un risque.

🚩 Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux

🚩 DECEDE LE 5 AVRIL 2011 A 74 ANS

Fermer

✓

Exemple

Fichier de Pharmacovigilance

Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
FOSAMAX BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
OSTEPAM BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
PORPHYRIE	Anesthésiques		
PROBLÈMES CARDIAQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		


Ajouter Supprimer

Contre-indications

Avertissements Anesthésies

Fosamax Bisphosphonates
Contre indications : extraction

Patient avec prescription "Fosamax"




Données bio Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

A PRIS DES BIPHOSPHONATES FOSAMAX DE 2003 A 2005

L'état du patient n'a pas été revu

À l'ouverture de la
fiche patient : Alerte



Anticancéreux, Biphosphonates
Des anticancéreux et/ou des biphosphonates et apparentés sont enregistrés pour cette patiente.
Cela peut représenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires.

Fermer

Patient avec prescription avec alerte

⇒ Message d'alerte de confirmation avant suppression

Données bio				Antécédents	Prescriptions chroniques	Allergies		
	Nom	Indications	Au					
	FOSAMAX 70MG CPR 4	Médicament en cas de traitement de maladies osseuses	02/05/17					

L'état du patient a été revu aujourd'hui

Données bio				Antécédents	Prescriptions chroniques	Allergies		
	Nom	Indications	Au					
	FOSAMAX 70MG CPR 4	Médicament en cas de traitement de maladies osseuses	02/05/17					

L'état du patient a été revu aujourd'hui

Supprimer une ligne

114 -

Voulez-vous supprimer la prescription chronique "FOSAMAX 70MG CPR 4" ?

114 -


ATTENTION
Il se peut que le produit que vous êtes en train de supprimer fasse partie des BIPHOSPHONATES ou d'anticancéreux problématiques.
Si c'est le cas, il est préférable ne pas le supprimer et de le laisser indéfiniment de la fiche du patient.
Confirmez-vous la suppression de ce produit et assumez-vous en le risque ?


Patient avec prescription "Antithrombiques"


À l'ouverture de la fiche patient
Alerte

d


Antithrombotiques
Antithrombotiques enregistrés pour ce patient :
ELIQUIS 2,5MG CPR 60
ASPEGIC 100MG NOURRISSON SACHET 20
Cela peut représenter un risque.

 Attention, ELIQUIS est un nouvel anticoagulant, consulter le cardiologue

 Ce patient a des problèmes cardiaques

 Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs

Fermer



Dents Cotation Honoraires R. F. Commentaire

Patient avec allergie "Pénicillines"

Ordonnance de base sans LAP

Lors de la rédaction de l'ordonnance sans LAP
Si on met par erreur Clamoxyl
Alerte

Données bio Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

- Pénicillines
- Amoxicilline
- Céfazoline
- Ceftriaxone
- ALLERGIE BETALACTAMES
- Iobitridol

11/01/17

L'état du patient n'a pas été revu

Acte gratuit SMG Avec un duplicata A4 dupli Email Imprimer Historique

Taille (en cm) 164 Poids (en kg) 62,0 Créatininémie (micromol/L) Allaitement Grossesse

Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

- Pénicillines
- Amoxicilline
- Céfazoline
- Ceftriaxone
- ALLERGIE BETALACTAMES
- Iobitridol
- Sodium hydroxyde

Le: 03/05/2017

Nom Posologie

Nom Posologie

Nom Posologie

Nom Posologie

Nom Posologie

Ordonnance

ATTENTION ! Incompatibilité possible, confirmez vous la prescription ?

Qui Non

Liste Ordos. types Pharmacopée Posologie

Tri par nom actuel Tri par ancien nom

<Tous>

Liste personnelle

- ALODONT BAIN BOUCHE 200ML
- ALODONT BAIN BOUCHE 500ML
- ARTOTEC 50MG/0,2MG CPR 30
- AUGMENTIN 1G/125MG AD SACHET 12
- AUGMENTIN 500 mg (24 comprimés)
- AUGMENTIN 500MG/62,5MG AD CPR 16
- BI-MISSILOR GE 250MG CPR 10
- BIRODOGYL CPR 10
- BUCCAGEL GEL BUCCAL TUB 15ML
- CEBUTID 50MG CPR 30
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 3
- CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6
- CLAMOXYL 125MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 250MG PDR 60ML
- CLAMOXYL 500 mg (suspension buvable)
- CLAMOXYL 500MG GELLULE 12
- CUTERPES 1% GEL DERM TUB 5G
- DAFALGAN 500MG CPR 16
- DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUB 40G
- DALACINE 300MG GELLULE 16
- DYNEXAN 2% CREME BUCCALE TUB 10G
- EFFERALGAN 500MG CPR 16
- EFFERALGAN 500MG CPR EFF SECABLE 16

Choix d'une posologie pour : CLAMOXYL 500MG GELULE 12

Posologies disponibles

- Adulte. Traitement de la phase primo-secondaire. Maladie de Lyme
- Adulte. Traitement par protocole oral. Traitement prophylactique de l'endocardite bactérienne
- Adulte. Traitement relais de la voie parentérale. Endocardite
- Adulte. insuffisant rénal (10 < Clcr < 30 ml/min). Traitement relais de la voie parentérale. Endocardite

3100 mg par jour à avaler sans ouvrir avec un verre d'eau pendant 15 à 21 jours. OU 6 gélules par jour à avaler sans ouvrir avec un verre d'eau pendant 15 à 21 jours.

Ce médicament peut être pris pendant ou entre les repas. Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau. ENFANT NORMORENAL : Maladie de Lyme :- érythème chronique migrant strictement isolé : 50 mg/kg/jour,- en cas de manifestations systémiques évoquant une dissémination hémotogène de Borrelia burgdorferi, les posologies peuvent être v

Posologie structurée

Unité de prise : gélule Dose journalière = 2 gélule(s)

1 fois par jour

Nyctémère

1 heure avant l'intervention

Toutes les (= fréquence en nombre d'heures)

Tous les (= fréquence en nombre de jours)

Nombre de fois par jour

Nombre de fois par semaine

Nombre de fois par mois

Commentaire

Indications
Motif de prescription

1 gélule le matin et le soir pendant 5 jours

OK Annuler Monographie

LOGOS_w aide à la prescription 1.0.A - Docteur Ninon CREMONINI

Acte gratuit SMG
Avec un duplicata A4 dupli

ue 65 ans 9 mois

Taille (en cm) 164 Poids (en kg) 62,0 Créatinémie (micromoles/l) Allaitement Grossesse

Antécédents | Prescriptions chroniques | Allergies

HISTERECTOMIE

Le: 03/05/2017 Cout total calculable de l'ordonnance : 1,18 €

1,18 € **Amoxicilline 500 mg gélule (CLAMOXYL)**
1 gélule le matin et le soir pendant 5 jours

Convertir en DC
Posologie
Monographie
Documents
Enlever
Conserv

Ce produit est pris en compte pour la sécurisation de l'ordonnance

Liste Ordonnances types Pharmacopée

Banque Claude Bernard 5.0.4.8 - 01/04/2017 - 24/03/2017

Spécialités médicamenteuses

Tri par nom Tri par prix

	Prix par ucd
CLAMOXYL 125MG PDR. 60ML	1,08
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 14	0,30
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6	0,31
CLAMOXYL 1G PDR IM-IV 10	
CLAMOXYL 1G PDR IM-IV 1	1,42
CLAMOXYL 250MG PDR. 60ML	1,38
CLAMOXYL 2G PDR. IV 10	
CLAMOXYL 500MG GELULE 12	0,12
CLAMOXYL 500MG PDR. 60ML	1,73
CLAMOXYL 500MG PDR. IM-IV 10	


Recherche par spécialité


Recherche (tapez les premières lettres) : CLAM

Ok Monographie Documents officiels


Rédaction libre

Analyser Afficher les détails de l'analyse Convertir l'ordonnance en DC Conserv





- ⇒ Lors de la demande d'impression
- ⇒ Apparition des alertes



LOGOS_w aide à la prescription 1.0.A - Docteur Ninon CREMONINI

Acte gratuit SMG
 Avec un duplicata A4 dupli

Taille (en cm) 164 **Madame** **je 65 ans 9 mois**
 Poids (en kg) 62,0 Créatininémie (micromoles/l) Allaitement Grossesse

Antécédents | Prescriptions chroniques | Allergies

+ HYSTERECTOMIE
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Le: 03/05/2017
 1.18 € **Amoxicilline 500 mg gélule (CLAMOXYL)**
 1 gélule le matin et le soir pendant 5 jours
 ALD
 NR
 NS
 Ce produit est pris en compte pour la sécurisation de l'ordonnance

LOGOS_w aide à la prescription 1.0.A - Docteur...
 ? voulez-vous continuer ?

 Tri par nom Tri par prix

	Prix par ucd
CLAMOXYL 125MG PDR 60ML	1,08
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 14	0,30
CLAMOXYL 1G CPR DISPERSIBLE 6	0,31
CLAMOXYL 1G PDR IM-IV 10	
CLAMOXYL 1G PDR IM/IV 1	1,42
CLAMOXYL 250MG PDR 60ML	1,38
CLAMOXYL 2G PDR IV 10	
CLAMOXYL 500MG GELULE 12	0,12
CLAMOXYL 500MG PDR 60ML	1,73
CLAMOXYL 500MG PDR IM-IV 10	

Recherche par spécialité
 Recherche (tapez les premières lettres) :
 CLAM

Afficher les détails de l'analyse

⇒ Passage du médicament en rouge

⇒ Message d'alerte pour continuer




Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHTOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE			
GROSSESSE			
I.CORONARIENNE			
INFARCTUS			
INSUFFISANCE C			
INSUFFISANCE C			
OSTEPAM BISPHT			
PORPHYRIE			
PROBLÈMES CAR			
SKELID BISPHTOS			
TROUBLES DU RY			
ZOMETA BISPHTO			
ZYLORIC			

Contre-indications et Avertissements

⇒ Permettent de piloter les mécanismes d'avertissements internes à LOGOSw et fonctionnent indépendamment de toute base de données médicamenteuses



Ajouter

Supprimer

Contre-indications

Avertissements

Anesthésies



Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
OSTEPAM BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
PORPHYRIE	Anesthésiques		
PROBLÈMES CARDIAQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		

Onglet Contre-indications

Une table vous permet de saisir et de consulter l'ensemble des contre-indications

Ajouter

Supprimer



Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	

⇒ Vous pouvez **sélectionner** l'un des enregistrements du fichier, en vous plaçant sur la ligne correspondante, pour le modifier

⇒ Vous pouvez créer un nouvel enregistrement (bouton **ajouter** et entrer des données)

⇒ Vous pouvez détruire l'un de ces enregistrements, en vous plaçant sur la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton **supprimer**

Ajouter

Supprimer

⇒ Les modifications et ajouts
sont automatiquement
sauvegardés lorsque vous
changez de ligne dans la
table



Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	Sulfarlem S25		
ADROVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypog	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
OSTEPAM BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
PORPHYRIE	Anesthésiques		
PROBLÈMES CARDIAQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		

La table présente la colonne **Pathologie** : c'est la pathologie ou éventuellement le médicament qui sera recherché dans la fiche des antécédents du patient

Ajouter

Supprimer



Quitter

Contre-indications

Pathologie	Contre-indication 1	Contre-indication 2	Contre-indication 3
ACTONEL BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADENOME PROSTATIQUE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ADROVANCE BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ANGOR	Adrénaline		
ARELIA BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BISPHTOSPHONATES	ANESTHESIE	EXTRACTION	
BONVIVA BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
CLASTOBAN BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
DAKTARIN	AVK	Sulfamide hypo	
DIABETE	Adrénaline		
DIDRONEL BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAMAX BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
FOSAVANCE BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
GLAUCOME	Sulfarlem S25		
GOUTTE	PENICILLINE		
GROSSESSE	Adrénaline	RODOGYL	Cuterpes
I.CORONARIENNE	Adrénaline		
INFARCTUS	Adrénaline		
INSUFFISANCE CARDIAQUE	Adrénaline		
INSUFFISANCE CORONARIENNE	Adrénaline		
OSTEPAM BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
PORPHYRIE	Anesthésiques		
PROBLÈMES CARDIAQUES	Adrénaline		
SKELID BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
TROUBLES DU RYTHME	Adrénaline		
ZOMETA BISPHTOSPHONATE	ANESTHESIE	EXTRACTION	
ZYLORIC	PENICILLINE		


La table présente les colonnes **Contre-indications 1, 2 ou 3**
 Ce sont la ou les prescriptions qui devront être évitées
 lorsque la pathologie (ou le médicament) associée sera
 présente dans les antécédents du patient


Ajouter


Supprimer


- ⇒ À l'ouverture d'un dossier patient
- ⇒ Déclenchement d'une alerte pour certains types de médicaments enregistrés dans les prescriptions chroniques par une base de données médicamenteuses

CLAVÉRIE Gerard


 Antithrombotiques
Antithrombotiques enregistrés pour ce patient :
ELIQUIS 2,5MG CPR 60
ASPEGIC 100MG NOURRISSON SACHET 20
Cela peut représenter un risque.

 Attention, ELIQUIS est un nouvel anticoagulant, consulter le cardiologue

 Ce patient a des problèmes cardiaques

 Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs

Fermer



Dents Cotation Honoraires R F Commentaire

⇒ Si vous mentionnez comme **contre-indication "Adrénaline" ou "A. locaux"** une fenêtre d'alerte sera affichée lors de l'ouverture du dossier d'un patient présentant la pathologie (ou la prise médicamenteuse) associée

⇒ Si vous utilisez certaines abréviations (par exemple AVK) **essayez d'utiliser toujours les mêmes, avec à chaque fois la même orthographe**



Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSP	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques
STEN	Ce patient a des problèmes cardiaques
PRAXADA ; XARELTO ; ELIQUIS	Attention, (TERME) est un nouvel anticoagulant, consulter le cardiologue

Onglet Avertissements

⇒ Vous pouvez modifier ou rajouter à votre guise

⇒ Cependant, attention aux modifications intempestives

⇒ Prévoir d'ajouter plutôt que de modifier ou supprimer les données par défaut

Termes provoquant l'avertissement

LATEX

Texte de l'avertissement

Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex

Police

Arial

12

 Gras Souligné Italique

Couleur du texte



Couleur de fond



Contre-indications

Avertissements

Anesthésies



Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSPO	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques
STEN	Ce patient a des problèmes cardiaques
PRAXADA ; XARELTO ; ELIQUIS	Attention, \TERME\ est un nouvel anticoagulant, consulter le cardiologue

Onglet Avertissements

⇒ À sa partie supérieure, une table reliée à un masque de saisie situé en dessous

⇒ La sélection d'une ligne permet de remplir les champs du masque de saisie

Termes provoquant l'avertissement

LATEX

Texte de l'avertissement

Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex

Police

Arial

12

 Gras Souligné Italique

Couleur du texte



Couleur de fond



Contre-indications

Avertissements

Anesthésies



Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSP	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques
STEN	
PRAXADA ; XA	

Termes provoquant l'avertissement

⇒ Il s'agit des mots ou portions de mots dont la présence dans l'onglet "Antécédents", "Prescriptions chroniques" ou "Allergies" de la fiche patient va déclencher l'affichage d'un post-it d'avertissement lors de l'ouverture du dossier

Termes provoquant l'avertissement

LATEX

Texte de l'avertissement

Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GA

Police

Arial

12

 Gras Souligné

Contre-indications

Données bio

Antécédents


Prescriptions
chroniques

Allergies



Latex

L'état du patient a été revu aujourd'hui





Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSP	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques
STEN	Ce patient a des problèmes cardiaques

Texte de l'avertissement

⇒ Il s'agit du texte qui sera affiché dans la fenêtre d'avertissement lors de l'ouverture du dossier

consultez le cardiologue

Pierre



Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex

Fermer



Termes provoquant l'avertissement

LATEX

Texte de l'avertissement

Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex

Police

Arial

12

Gras

Souligné

Italique

Couleur du texte



Couleur de fond



Contre-indications

⚠ Avertissements

🪄 Anesthésies



Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSPO	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques

Données relatives à la police de caractère et aux couleurs du post-it

⇒ Permettant de définir l'aspect du texte affiché dans le post-it d'avertissement lors de l'ouverture du dossier patient

le cardiologue

Pierre



Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex

Fermer



Termes provoquant l'avertissement

LATEX

Texte de l'avertissement

Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout

Police

Arial

12

 Gras Souligné Italique

Couleur du texte



Couleur de fond



Contre-indications

Avertissements

Anesthésies



Quitter

Avertissements à l'ouverture de la fiche des patients

Termes	Libellé de l'avertissement
ANESTH ; LOCAU ; LOCAL ; AINE ; AÏNE	Ce patient semble présenter une contre-indication majeure aux anesthésiques locaux
ADRENAL	Ce patient semble présenter une contre-indication aux vaso-constricteurs
GROSSESSE ; ENCEINTE	Cette patiente semble présenter une contre-indication relative aux anesthésiques locaux
VALVUL ; VALVE ; AOERT ; MITR ; TRICU ; FALL ; TETRALO ; TRANSPO	Ce patient semble avoir besoin d'une couverture antibiotique avant tout traitement dentaire
LATEX	Ce patient semble présenter une contre-indication absolue à l'utilisation de GANTS en LATEX et plus généralement de tout matériau contenant du latex
PHOSPHONA	Ce patient semble présenter un risque important à la réalisation d'EXTRACTIONS dentaires
PACEMAKER	Ce patient a des problèmes cardiaques
STEN	
PRAXADA;	

Onglet Avertissements

⇒ Les icônes en bas à droite

⇒ La petite loupe : Aperçu de l'avertissement

⇒ L'icône feu : Détruire un avertissement

⇒ L'icône + : Ajouter un avertissement

⇒ Coche verte pour valider les données du masque de saisie

⇒ Flèche rouge pour annuler la frappe dans un champ non encore validé

Police

Arial

12

 Gras Souligné Italique

Couleur du texte

Couleur de fond



Contre-indications

Avertissements

Anesthésies

Onglet Anesthésies

⇒ N'est actif et n'a de signification qu'en cas d'utilisation d'une base de données médicamenteuses à jour et en bon état de fonctionnement

⇒ Dans le cas contraire il apparaît grisé

⇒ Permet de saisir les codes CIP des produits anesthésiques utilisés (si présents dans la base de données médicamenteuses)

Produits anesthésiants utilisés

Nom du produit	Code produit	
		▲
		▼

Ajouter

Supprimer

Voir la fiche



Quitter

Onglet Anesthésies

Permet à l'ouverture de la fiche patient de rechercher contre-indications et allergies

Produits anesthésiants utilisés

Nom du produit	Code produit
ALPHACAINE N CART 1,8ML 100	34009324120

[Ajouter](#)[Supprimer](#)[Voir la fiche](#)

- ⇒ Les références saisies permettent lors de l'ouverture de la fiche d'un patient, la **recherche de contre-indications et d'allergies** interdisant l'usage du ou des produits anesthésiques référencés
- ⇒ Un avertissement s'affichera à l'ouverture de la fiche patient si dans les onglets "Antécédents", "Prescriptions chroniques" ou "Allergies" de la fiche patient, il y a des pathologies qui provoquent au niveau de la base de données médicamenteuses utilisée une **interaction avec les codes CIP des anesthésiques référencés**


Données bio Antécédents Prescriptions chroniques Allergies

+ Hypertension artérielle


L'état du patient a été revu le 04/05/2017

Francoise


Précaution d'emploi

 ALPHACAINE N CART 1,8ML 100 avec Hypertension artérielle
ALPHACAINE N CART 1,8ML 100 avec Hypoxie

Précaution d'emploi

 PRESSICAINE A S/VC 30MG/ML CART 50 avec Hypoxie

Fermer





Quitter

Produits anesthésiants utilisés

Nom du produit	Code produit
ALPHACAINE N CART 1,8ML 100	34009324120
PRESSICAINE A S/VC 30MG/ML CART 50	34009326725

Ajouter

Supprimer

Voir la fiche



Possibilité d'ouvrir la
fiche dans la base de
données médicamenteuses



Produits anesthésiques

Nom du produit
ALPHACAINE N CART 1,8ML 100
PRESSICAINE A S/C 30MG/ML CART 50

Aperçu sur Banque de données 'Claude Bernard'

MONOGRAPHIE

- Tous les chapitres
- Forme et présentation
- Composition
- Classes thérapeutiques
- Classes ATC
- Indications
- Posologies
- Contre indications
- Précautions d'emploi
- Interactions
- Grossesse et allaitement
- Conduite et utilisation de machine
- Effets indésirables
- Surdosage

PRESSICAINE A SANS VASO (3%) 30 mg/mL Solution injectable à usage dentaire Boîte de 50 Cartouches de 1.75 ml (Produit Hospitalier)

[\[version imprimable\]](#)

Forme et présentation

Forme	: Solution injectable à usage dentaire
Dosage	: 30 mg/mL
Contenance	: 2625 mg ou 87.5 ml

Composition

AMM du 09/10/2001

Exprimé par : 100 ml.

Imprimer Quitter

[Ajouter](#) [Supprimer](#) [Voir la fiche](#)



Anesthésies

REMARQUES

- ⇒ Lorsque vous modifiez le fichier vous devez savoir ce que vous faites !
- ⇒ En outre les fonctions de pharmacovigilance de LOGOSw ne sauraient en aucun cas se substituer à votre propre vigilance ni à vos connaissances et ne pourraient vous dégager d'aucune de vos obligations en la matière

- ⇒ N'allongez pas inutilement le fichier de pharmacovigilance
- ⇒ À l'appel de chaque dossier, LOGOSw lit en effet une grande partie du fichier
- ⇒ Plus il sera long, plus longs seront les temps de traitement